

Indikationsliste Kardiologie - Herz, Kreislauf und Gefäße

Die Anschlussheilbehandlung (AHB) beschreibt die medizinische Leistung zur Rehabilitation, die sich unmittelbar oder in engem Zusammenhang an eine Behandlung im Krankenhaus anschließt.

Krankheiten des Herzens und des Kreislaufs		
Indikation	Voraussetzung	Kontraindikation
Zustand nach akutem Herzinfarkt		schwere kardiale Dekompensation
Koronare Herzkrankheit ohne akuten Herzinfarkt	nur nach komplikationsreichem, meist instabilem Verlauf und nach Beherrschung der Akutsituation (Interventionelle Therapie allein ist nicht zwingend eine AHB-Indikation)	schwere kardiale Dekompensation
Zustand nach koronarer Bypass-Operation	nach Abschluss der postoperativen Behandlungsphase	schwere kardiale Dekompensation
Zustand nach Herzklappenoperation	nach Abschluss der postoperativen Behandlungsphase	schwere kardiale Dekompensation
Zustand nach operativer Korrektur angeborener Vitien	nach Abschluss der postoperativen Behandlungsphase	schwere kardiale Dekompensation
Zustand nach Herztransplantation	nach Abschluss der postoperativen Behandlungsphase	Transplantatversagen
Zustand nach sonstigen Herzoperationen (z. B. Aneurysmektomie, ICD-Implantation)	nach Abschluss der postoperativen Behandlungsphase	schwere kardiale Dekompensation
Kardiomyopathien	nur bei komplikationsreichem Verlauf; nach Beherrschung der Akutsituation und bei mittelfristig stabilem Krankheitsverlauf	schwere kardiale Dekompensation Steht bei einer alkoholtoxischen Kardiomyopathie die Alkoholkrankheit im Vordergrund, so sollte ein Eilantrag auf Entwöhnungsbehandlung beim zuständigen Rentenversicherungsträger gestellt werden.
Zustand nach entzündlichen Herzerkrankungen	nur bei protrahiertem Verlauf und nach Abklingen des Akutstadiums	schwere kardiale Dekompensation
Zustand nach Lungenembolie	nur bei ausgedehntem Perfusionsausfall	

Krankheiten der Gefäße		
Indikation	Voraussetzung	Kontraindikation
Periphere arterielle Verschlusskrankheit nach Fontaine IIa und IIb		
Zustand nach Operationen am arteriellen Gefäßsystem	nach Abschluss der postoperativen Behandlungsphase	
Zustand nach akutem thrombotischen Syndrom im Becken- und Beinvenenbereich mit ausgeprägten peripheren Ödemen		
Zustand nach Operationen am venösen System	nach Abschluss der postoperativen Behandlungsphase	